

# Colutorio de Triamcinolona Acetónido

- Triamcinolona Acetónido 0,1%.
- Alcohol Etílico (96°) 25%.
- Agua Destilada 72%
- Propilenglicol 3%.

(11 mg de la sal equivalen a 10 de la base)

## Utillaje Empleado

- Vaso de Precipitados.
- Varilla de Vidrio.
- Probeta.

## Modus Operandi

1. Pesamos, incorporamos y disolvemos la triamcinolona en un vaso de precipitado de cristal junto con el alcohol y el propilenglicol.
2. Calentamos en b.m. el agua, añadiendo aquí, poco a poco, el alcohol etílico, el propilenglicol y la triamcinolona.
3. A dosis iguales al 0.2 % o superiores, es imposible que el principio activo quede disuelto en el excipiente, cuando éste se enfría; observando que lo que antes era una solución, límpida y transparente, se enturbia, y comienza una inexorable precipitación, por lo que nuestro colutorio solución, se convierte técnicamente, en una **suspensión**.

## Material de Acondicionamiento

Envase de plástico de topacio.

## Controles

Los propios de una solución o suspensión, en función de la concentración del p.a.

## Caducidad.

120 Días.

## Conservación

Se debe de conservar bien cerrado y aislado de la luz.

## Observaciones

Se debe de advertir al paciente QUE LA PRESENTE FÓRMULA CONTIENE ALCOHOL Y PROPILENGLICOL.

## **BIBLIOGRAFÍA**

- *Llopis Clavijo M<sup>a</sup> J, Baixauli Comes V. Formulario básico de medicamentos magistrales. Valencia 2001 (pág. 465)*

## Prospecto

### **Colutorio de Triamcinolona**

#### **COMPOSICIÓN POR 100 ml**

<b>Triamcinolona Acetónido</b>	<b>0,1 %</b>
<b>Alcohol Etilico (96°)</b>	<b>25%.</b>
<b>Propilenglicol</b>	<b>3%</b>
<b>Agua Destilada c.s.p</b>	<b>100 ml.</b>

#### **INDICACIÓN**

Principio activo con actividad antiinflamatoria, antialérgica y antirreumática. En nuestro caso es empleado en úlceras aftosas y estomatitis.

#### **POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN**

Generalmente se recomienda realizar enjuagues bucales, 2 ó 3 veces al día después de las comidas. Se recomienda no ingerir.

#### **EFFECTOS ADVERSOS**

Puede aparecer escozor en la zona de aplicación.

#### **CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES.**

Alergia a cualquier componente de la fórmula. ESTA FÓRMULA CONTIENE ALCOHOL Y PROPILENGLICOL. En caso de intoxicación o sobredosis el paciente debe acudir inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de Información Toxicológica, Tlfn: 915620420.

#### **CONSERVACIÓN**

Mantenga este medicamento a temperatura ambiente (inferior a 25 °C) y protegido de la humedad.

#### **CADUCIDAD**

Este preparado no puede administrarse después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

**ALFONSO BARBANCHO TORRICO**  
**Técnico de laboratorio**