

Timolol 0.5 % gel csp 30g

Componentes:

Timolol maleato 0.15 g

Propilenglicol 2 ml

Gel carbomero csp 30 g

Modus operandi

Hacer una pasta del timolol con propilenglicol e incorporar al gel previamente preparado.

Homogeneizar en el envase unguator, etiquetar y empaquetar.

Material de acondicionamiento

Tubo pomada aluminio, envase tipo unguator con cánula...

Medios y materiales

Balanza, mortero, espátulas, pistilo, unguator.

Controles

Aspecto externo: gel evanescente incoloro. Verificación de peso. Determinación de la extensibilidad.

Conservación

Envase bien cerrado y protegido de la luz.

Caducidad

1 mes

Vía de administración

Tópica

Bibliografía

Pope E, Ajith C. Timolol gel for infantile hemangiomas: a pilot study. *Pediatric Dermatology*. 2010;26:664.

Terapéutica

Tratamiento de los hemangiomas infantiles (especialmente en los hemangiomas superficiales perioculares)

Instrucciones al paciente

Indicaciones

Tratamiento de los hemangiomas infantiles (especialmente en los hemangiomas superficiales perioculares)

Modo de empleo

Según prescripción. Lo usual es aplicar en hemangioma dos veces al día por la mañana y la noche.

Aplicar uniformemente sobre la zona a tratar.

Consejos

Es importante atenerse a las dosis y pautas prescritas.

Reacciones adversas

No se han presentado en los ensayos efectuados hasta el momento